




LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Ecureuil du Yucatan

 Yucatan squirrel



Tambako

(Photo Tambako)

Endémique du Belize, du Guatemala et du Mexique, l'écureuil du Yucatan est un petit sciuridé arboricole. Composé de 3 sous-espèces, autrefois apparentées à l'écureuil gris, l'écureuil du Yucatan qui fréquente les forêts mixtes en dessous de 750 mètres d'altitudes, est un animal principalement diurne qui se nourrit de fruits, de graines et de jeunes pousses. Plutôt discret, même en journée, l'écureuil du Yucatan s'abrite en soirée dans des nids qu'il aménage à travers les

branches, grâce à des brindilles et à des feuilles qu'il trouve sur son chemin. Atteignant sa maturité sexuelle vers l'âge de 12 mois, l'écureuil du yucatan se reproduit vers Avril-Mai et donne naissance à 2 ou 3 petits.

NOM : Ecureuil du Yucatan (*Sciurus yucatanensis*)

CLASSE : [Mammifères](#)

ORDRE : [Rongeurs](#)

FAMILLE : [Sciuridés](#)

TAILLE : 24 cm

POIDS : 220 g

DUREE DE VIE : 3 à 4 ans

REPARTITION : Bélize, Guatemala, Mexique

HABITAT : Forêts mixtes

ALIMENTATION : [Frugivore](#) : graines, fruits, fleurs, jeunes pousses...

REPRODUCTION : La maturité sexuelle de l'écureuil du Yucatan est atteinte vers l'âge d'un an, la durée de gestation même s'il elle n'est pas très bien connu, doit avoisiner les 30 à 40 jours et la femelle met bas 2 à 3 petits par portée.

PREDATEURS : Inconnu