





LES FICHES PEDAGOGIQUES

www.diconimoz.com



Marabout d'Afrique

 Stork marabout



(Photo Markéta Machová)

Assez disgracieux, cet oiseau de la famille des cigognes se reconnaît aisément à sa tête chauve, son énorme bec et sa longue poche gulaire. Capable de percer, avec son bec, la chair épaisse des charognes dont il se nourrit, le marabout d'Afrique est un oiseau sédentaire formant de petits groupes. Pouvant atteindre un poids de près de 9 kg, le marabout d'Afrique possède un vol lourd, caractérisé par de longs vols planés. Présent de l'Afrique de l'Est à l'Afrique du

Sud, le marabout est l'un des plus grands ciconiidés avec le jabiru d'Afrique.

NOM : Marabout (Leptoptilos crumenifer)

CLASSE : Oiseaux

ORDRE : Ciconiiformes

FAMILLE : Ciconiidés

TAILLE : 1,50 m , envergure 1,80 à 2 m

POIDS : 5 à 9 kg

LONGEVITE : 25 ans

REPARTITION : Tanzanie, Kenya, Afrique du Sud, Bénin...

HABITAT : Marais, cours d'eau, brousses, savanes...

ALIMENTATION : Carnivore : Charognes, reptiles, rongeurs, poissons, insectes, oiseaux (redoutable prédateurs des flamands roses)

REPRODUCTION : La maturité sexuelle du marabout d'Afrique est atteinte vers l'âge de 3 à 4 ans, la durée d'incubation est d'une trentaine de jours, et la femelle dépose 2 à 3 oeufs blanc et ovales.

PREDATEURS : Peu de prédateurs du fait de sa taille imposante.